

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ

Είναι αρκετά δύσκολο πολλές φορές να περιγράψεις το αυτονόητο, οτι δηλαδή οι εκτροφείς είναι οι απόλυτα υπεύθυνοι για την χορήγηση τροφής και νερού στους φτερωτούς μας φίλους. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πολύ καλά τις διατροφικές συνήθειες και ανάγκες των καναρινιών κατά την διάρκεια του έτους και ανάλογα να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε στοιχεία από την διατροφή τους.

Μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα, έχει γίνει στο άρθρο του Παναγιώτη Μακρή (Τροφές Καναρινών) στο τεύχος Καλοκαίρι 1998 του Περιοδικού της ΕΟΟ "Καναρινία και Πουλιά Συντροφιάς" στην οποία και σας παραπέμπω.

Γνωρίζοντας λοιπόν οτι το 90% της διατροφής του καναρινιού αποτελείται από σπόρους θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε αυτούς τους σπόρους και να δούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την θρεπτική αξία τους.

Καναρινόσπορος ή Κεχρί ή Ασπούρι



Απαραίτητο συστατικό όλων των μιγμάτων τροφής με σπόρους. Το μέγεθος και το χρώμα διαφέρουν ανάλογα με την χώρα προέλευσης.

Πρωτείνες	11,9	%
Λιπίδια	4,5	%
Υδατάνθρακες	10,9	%

Βρώμη



Πέπτεται πολύ εύκολα και μπορούν να την πάρουν εύκολα τα μικρά σαν πρώτη τροφή. Προσοχή γιατί παχαίνει. Βρίσκεται σε ολόκληρη ή αλεσμένη μορφή.

Πρωτείνες	15,4	%
Λιπίδια	6,3	%
Υδατάνθρακες	2,4	%

Καναβούρι



Περιέχει πρωτείνες πρώτης ποιότητας. Πέπτεται πολύ εύκολα από τα πουλιά. Βοηθάει στο ζευγάρωμα. Προσοχή ! Η υπερκατανάλωση κάνει τα πουλιά πολύ ανήσυχα και επιθετικά.

Πρωτείνες	21,4	%
Λιπίδια	35,3	%
Υδατάνθρακες	6,2	%

Λιναρόσπορος



Σπόροι ανοιχτού ή σκούρου χρώματος. Περιέχουν μεγάλη ποσότητα Λιπαρών οξέων τύπου Ωμέγα 3, απαραίτητα για την ανάπτυξη του πτερώματος. Βοηθάει την απορόφηση των λιπιδίων (βιταμίνων) γιατί συμβάλει στον σχηματισμό της γαστρικής βλένας.

Πρωτείνες	21,5	%
Λιπίδια	35,9	%
Υδατάνθρακες	6,2	%

Νίζερ



Ο σπόρος που προτιμούν τα περισσότερα πουλιά. Πολύ ακριβός. Απαραίτητος σε κάθε μίγμα. Έχει πολύ καλή σχέση ασβεστίου / φωσφόρου.

Πρωτείνες	24,9	%
Λιπίδια	36,2	%
Υδατάνθρακες	17,5	%

Ρούπσεν κόκκινο ή καφέ γλυκό



Το χρώμα του εξαρτάται από τον τόπο παραγωγής του. Πλούσιο σε Πρωτείνες και Λιπαρά. Προσοχή στην χρήση του γιατί παχαίνει.

Πρωτείνες	20,4	%
Λιπίδια	43,6	%
Υδατάνθρακες	6,6	%

Golza ή Ρούπσεν πικρό



Πιο μεγάλο από το προηγούμενο, πιο σκούρο και πιο πικρό. Με την ίδια θρεπτική αξία του γλυκού Ρούπσεν.

Παπαρουνόσπορος



Πολύ πλούσιος σε λιπαρά. Έχει χαρακτήρα ηρεμιστικού. Ιδανικό για μείγματα. Τροφή Εκθέσεων. Προσοχή γιατί μπορεί να σταματήσει το κελάιδημα.

Περίλλα

Ένας Σπόρος που προέρχεται από την Ινδία. Για χρόνια είχε ξεχαστεί, αλλά πρόσφατα έχει πάρει την θέση του στα μίγματα τροφών. Ιδανικός για την περίοδο αλλαγής του πτερώματος λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.

Πρωτεΐνες	45,0 %
Λιπίδια	4,0 %
Υδατάνθρακες	38,0 %

Γνωρίζοντας ότι μια πλήρης διατροφή με σπόρους για τα καναρίνια θα πρέπει να περιέχει περίπου 15% Πρωτεΐνες, 14% Λιπαρά και 6% Υδατάνθρακες, προτείνουμε κάποια μείγματα τροφής τροποποιημένα ανάλογα με το είδος, την χρονική περίοδο, αλλά και τις ειδικές καταστάσεις που μπορεί ν' αντιμετωπίσουν τα καναρίνια.

Μείγμα για Malinois και Harz		Μείγμα για όλο τον χρόνο και για όλα τα καναρίνια	
Κεχρί	63 %	Κεχρί	76 %
Ρούπσεν γλυκό	19 %	Ρούπσεν γλυκό	12 %
Ρούπσεν πικρό	6 %	Βρώμη	5 %
Λιναρόσπορος	5 %	Λιναρόσπορος	4 %
Βρώμη	3 %	Καναβούρι	2 %
Καναβούρι	2,5 %	Νίζερ	1 %
Νίζερ	1,5 %		
	<hr/> 100 %		<hr/> 100 %

Μείγμα για την Πτερόροια		Μείγμα κατά την διάρκεια των Εκθέσεων	
Κεχρί	79 %	Κεχρί	67 %
Νίζερ	8 %	Νίζερ	13 %
Περίλα	4 %	Λιναρόσπορος	9 %
Λιναρόσπορος	3 %	Βρώμη	6 %
Ρούπσεν γλυκό	3 %	Εξωτικοί σπόροι Υγείας *	3 %
Καναβούρι	3 %	Περίλα	2 %
	100 %		100 %

* Οι Εξωτικοί σπόροι Υγείας είναι ένα μείγμα από 30 τουλάχιστον διαφορετικούς σπόρους.

Μείγμα για Επαγγελματίες που δεν σκέφτονται το κόστος.		Ανάλογα με την χρονική περίοδο αλλά και τις ανάγκες του καναρινιού, προσθέτουμε Βρώμη ή Περίλα.
Κεχρί	82 %	
Νίζερ	12 %	
Λιναρόσπορος	3 %	
Καναβούρι	3 %	
	100 %	

Λόγω του μεγάλου αριθμού των εκτροφών που ασχολείται με αγριοπούλια, θ' αναφέρουμε ενδεικτικά δύο μείγματα για να δούμε την διαφορά της περιεκτικότητας των μειγμάτων σε σχέση με αυτό των καναρινιών.

Μείγμα για ντόπια αγριοπούλια σποροφάγα.		Μείγμα για Καρδερίνες (Γαρδέλια)	
Κεχρί	46 %	Κεχρί	33 %
Ρούπσεν γλυκό	25,5 %	Ρούπσεν γλυκό	20 %
Λιναρόσπορος	7 %	Νίζερ	16 %
Νίζερ	7 %	Σπόροι Υγείας	8 %
Βρώμη	5,5 %	Λιναρόσπορος	5,5 %
Καναβούρι	5 %	Σπόροι Σπανακιού	5 %
Παπαρουνόσπορος	4 %	Βρώμη	4 %
	100 %	Βρώμη τριμμένη	4 %
		Καναβούρι	2,5 %
		Περίλα	2 %
			100 %

Προεραϊκά μπορούμε να προσθέσουμε σε μικρές ποσότητες Παπαρουνόσπορο, κίτρινο πάνικο και Γιαπωνέζικη Παπαγαλίνη.

Στην αγορά, όπως είναι φυσικό, μπορούμε να βρούμε αυτά τα μείγματα έτοιμα, αλλά και πολλά άλλα. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε τα δικά μας μείγματα γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των καναρινιών μας αλλά και τις ανάγκες τους.

Εδώ θα ήθελα ν' αναφερθώ στις νέες τάσεις που παρουσιάζονται στην διατροφή των σποροφάγων πτηνών στην διεθνή αγορά. Πρόκειται για ομογενοποιημένα μείγματα σπόρων ή προϊόντων σπόρων σε μορφή κροκέτας όπου περιέχονται όλα τα θρεπτικά συστατικά στις σωστές αναλογίες.

Οι λόγοι που οδηγούν στην παραγωγή τέτοιων τροφών είναι πρώτο ότι το πτηνό πρέπει να πέρνει κάθε μέρα όλα τα συστατικά που χρειάζεται και όχι πρώτα τους σπόρους που προτιμά και του αρέσουν, και δεύτερο για την ευκολία του εκτροφέα. Η διατροφή αυτή όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια στροφή από τους φυσικούς σπόρους στους τεχνικά κατασκευασμένους. Είναι βέβαια μια επιλογή που μπορεί να κάνει ο κάθε εκτροφέας μόνος του. Προσωπικά, θα του πρότεινα να ρωτήσει και τα καναρίνια του αν συμφωνούν.

Παναγιώτης Α. Μαματζάκης

Ιατρός

Εκτροφέας Καναρινιών

Μέλος Π.Ο.Κ.